

# WESCOHEX

## Jabón Quirúrgico Antiséptico de uso Externo

### DESCRIPCIÓN

Es un jabón quirúrgico a base de Gluconato de Clorhexidina al 4% usado como antiséptico de acción residual y de amplio espectro de microorganismos como bacterias Gram +, Gram -, así como de hongos.

**WESCOHEX** es un producto de gran acción residual el cual no es absorbido por la piel; lo mismo que su acción antiséptica y desinfectante no es inactivada en presencia de materia orgánica.

**WESCOHEX** no produce irritación ni sensibilidad en la piel. Este es un producto de alta espumación y una excelente enjuagabilidad.

### RECOMENDACIONES DE USO

WESCOHEX para el lavado de manos:

Retire todos los objetos que tenga en las manos, humedézcalas y aplique 5 cm<sup>3</sup> de WESCOHEX y comience a limpiar uña con uña, continúe con cada dedo en forma circular pasando al siguiente; luego frote los espacios interdigitales, continúe frotando enérgicamente palma con palma y palma con dorso y termine hasta 5 cm por encima de la muñeca frotando en forma circular. Enjuague con abundante agua hasta que no queden restos del WESCOHEX. Al final seque con toalla limpia y seca.

### MODO DE APLICACIÓN

WESCOHEX para el lavado de manos, aplique directamente sobre la piel y frote en forma circular de la parte distal a la proximal. En lavado de piel aplique la cantidad necesaria esparciéndola del centro a la periferia. En curaciones realice el procedimiento utilizando la técnica convencional establecida. Utilice sin diluir. No esterilice

### LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS SIN CEPILLO

Igual al procedimiento anterior teniendo la precaución de extender el lavado por el antebrazo hasta 5 cm por debajo del codo, siempre en forma circular y de la parte distal a la proximal sin devolverse y sin dejar escurrir. Enjuague con



# WESCOHEX

## Jabón Quirúrgico Antiséptico de uso Externo

Cuidado de forma que el agua corra de las manos hacia los codos, sin bajarlas y seque con compresa estéril.

**CURACIONES:** Lave sus manos, colóquese los guantes, observe la herida y proceda así: en heridas limpias lávelas con agua estéril o solución salina. En heridas contaminadas humedezca una gasa con WESCOHEX y frote en forma circular, sin devolverse y de la parte aséptica a la séptica, enjuague con agua estéril hasta retirar restos del producto, para proteger el tejido de granulación.

**PREPARACIÓN DE LA PIEL:** horas previas a la cirugía, el paciente debe realizarse baño corporal y hacerle antiséptica con WESCOHEX al sitio donde se hará la incisión, la remoción del vello debe ser limitada a la zona quirúrgica y una potencial extensión de ésta sin producir laceraciones o excoriaciones de la piel, realizándose sólo momentos antes de la intervención para evitar el crecimiento de bacterias.

La preparación operatoria de la piel del paciente se realiza en el quirófano, iniciando el procedimiento con WESCOHEX en el punto central del sitio en donde se realizará la incisión del centro a la periferia, utilizando gasa impregnada del WESCOHEX o con el guante directamente sobre la piel. Deje para lo último las áreas de alta contaminación como: ombligo, axilas, regiones inguinales y periné, Retire el exceso de producto con compresa estéril según la técnica convencional establecida.

Para lavado de manos utilice 5 cm<sup>3</sup> aproximadamente de WESCOHEX. En preparación de piel utilice la cantidad necesaria según el área en donde se realice la antisepsia. Por ejemplo para todo el cuerpo utilice 25 cm<sup>3</sup> de WESCOHEX. En curaciones aplique 25 cm<sup>3</sup> aproximadamente teniendo en cuenta el tamaño de la herida, si es necesario aplique más WESCOHEX. Para el lavado del cabello aplique 25 cm<sup>3</sup> aproximadamente, enjabónese durante 3 minutos, enjuáguese y repita de nuevo el procedimiento con una cantidad igual del WESCOHEX.



# WESCOHEX

## Jabón Quirúrgico Antiséptico de uso Externo

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

CADA 100 mL de producto contiene:

Gluconato de Clorhexidina..... 4.0 g.

Equivalente a 4% de ingrediente activo

Excipientes c.s.p..... 100 mL

### ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS

Parámetros	Valor Mínimo
Densidad (mínimo)	1.01 gr/cc
pH (mínimo)	6.5
Gluconato de Clorhexidina (mínimo)	4%
Aspecto	Líquido traslucido color rosado

### ORGANISMO

### CONCENTRACIÓN INHIBIDORA MÍNIMA PPM

Staphylococcus epidermidis:.....	1 min
Staphylococcus aureus: .....	1 min
Staphylococcus aureus resistentes a antibióticos:.....	1 min
Streptococcus pyogenes: .....	1 min
Corynebacterium diphtheriae: .....	30 seg
Serratia marcescens: .....	30 seg.
Escherichia coli: .....	30 seg.
Salmonella thyphosa:.....	30 seg.
Salmonella choleraesuis: .....	30 seg.
Proteus vulgaris: .....	30 seg.
Pseudomonas aeruginosa: .....	30 seg
Shigella sonnei.....	30 seg
Candida albicans: .....	30 seg



# WESCOHEX

## Jabón Quirúrgico Antiséptico de uso Externo

### ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura extrema y de los rayos directos del sol. Mantener a temperatura inferior de 30°C.

### CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. Hipersensibilidad al Gluconato de Clorhexidina a y/o sus componentes.

Evítese contacto con los ojos. No debe ser usado en cerebro, meninges y oído perforado.

**REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2009 M-012898-R1**

