Fecha de actualización: 23/Enero/2015
Versión: 02

WESCOHEX SOLUCIÓN

Jabón quirúrgico antiséptico de uso externo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Solución tópica germicida a base de gluconato de clorhexidina al 2.3%, ideal en la preparación del campo pre y post operatorio, inyectología y en el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras.
WESCOHEX SOLUCIÓN tiene acción rápida, persistente y de amplio espectro de microorganismos como bacterias Gram +, Gram -, así como de hongos.
Es un producto de acción residual, el cual no es absorbido por la piel; lo mismo que su acción antiséptica y desinfectante no es inactivada en presencia de material orgánico.
WESCOHEX SOLUCIÓN no produce irritación ni sensibilidad en la piel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cada 100 ml de producto contiene

Gluconato de clorhexidina	2.3 %
Excipientes c.s.p	100 ml

Densidad (g/ml)	1.01 mínimo
Gluconato de clorhexidina (%)	2.3 mínimo
pH	5.9 mínimo
Apariencia	Jabón líquido de color naranja

MODO DE USO

Utilice la cantidad necesaria de acuerdo a la zona a cubrir de forma que la piel quede totalmente impregnada de la solución.

En inyectología, impregnar una torunda de algodón con el producto y aplicar en el sitio donde se realizará la punción en forma circular de adentro hacia afuera sin devolverse en un área de 5 cm aproximadamente.

En áreas quirúrgicas aplicar por aspersión en el sitio donde se realizó o se realizará la incisión ampliando la zona y dejándolo secar libremente.

En el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras, desgermine previamente la piel y aplique la técnica recomendada para curaciones.

RECOMENDACIONES

Consérvese en lugar fresco y protegido de la luz. Mantener a temperatura inferior de 30°C en el envase y empaque original. Hipersensibilidad a los componentes. El gluconato de clorhexidina utilizado como antiséptico por vía tópica no debe ser empleado en pacientes con enfermedades de la piel o heridas que afectan a capas no superficiales de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si esto ocurriera, enjuagar inmediatamente con agua abundante.

PROPIEDADES DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICAS

Bacteria	Tiempo mínimo de contacto
Staphylococcus epidermidis	1 minuto
Staphylococcus aureus	1 minuto
Streptococcus pyogenes	1 minuto
Corynebacterium diphtheriae	30 segundos
Serratia marcescens	30 segundos
Escherichica coli	30 segundos
Salmonella thyphosa	30 segundos
Salmonella choleraesuis	30 segundos
Proteus vulgaris	30 segundos
Pseudomonas aeruginosa	30 segundos
Shigella sonnei	30 segundos
Candida albicans	30 segundos

PRESENTACIONES

Bolsa x 30 ml
Bolsa x 60 ml
Bolsa x 120 ml
Envase x 60 ml
Envase x 120 ml
Envase x 500 ml
Envase x 3.785 litros

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS

REGISTRO SANITARIO INVIMA Nº 2009M-0009291
Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM ICA.